



N°: MCI/CAAA 04/2019  
NM ISO 15 189

مختبر التحليلات الطبية جينالاب "أم الربيع"  
*Laboratoire de biologie médicale Génelab*  
"Oum Rabiâa"

Dr. Mohamed BENAZZOZ  
Pharmacien Biologiste



الدكتور بنعزوز محمد  
صيدلي إحصائي

Laboratoire certifié par  
**IMANOR**  
CERTIFICATION  
N° 2017 CSMQ.04 : 01  
NM ISO 9001 : 2015

## PRECONISATIONS SCOTCH TEST

### INTERET

Le présent document vous fournit les indications pour le prélèvement d'un Scotch test en vue de rechercher les œufs d'Oxyures (vers intestinaux), très fréquents chez les enfants et très contagieux.

### MATERIEL NECESSAIRE

- Du scotch transparent
- Deux lames

### PRECONISATIONS AVANT LE PRELEVEMENT

- Effectuer une toilette de la marge anale le soir avant d'aller se coucher.
- Ne pas faire de toilette intime de matin au réveil.
- Se rendre au laboratoire pour effectuer le prélèvement.

### PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT

- Décoller le scotch de son support sur environ 5 cm.
- Appliquer le côté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques secondes.
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame support en évitant de faire des bulles d'air.

**NB** : La lame sera observée au microscope, et les bulles peuvent gêner la lecture.

- Renouveler l'opération avec le second scotch et seconde lame.
- Renseigner les informations (nom, prénom et date de naissance) sur la lame à l'aide d'un crayon à papier.