



N°: MCI/CAAA 04/2019
NM ISO 15 189

مختبر التحليلات الطبية جنلاب "أم الربيع"
Laboratoire de biologie médicale Génelab
"Oum Rabiaa"

Dr, Mohamed BENZAOUZ
Pharmacien Biologiste

الدكتور بنعزوز محمد
صيدلي إجنابي



Laboratoire certifié par
IMANOR
CERTIFICATION
N° 2017 CSMQ.04 : 01
NM ISO 9001 : 2015

PRECONISATIONS URINE DE 1^{ER} JET

INTERET

Ce document fournit les indications pour effectuer le prélèvement de l'urine de 1^{er} jet pour rechercher certains germes responsables d'infections génitales.

MATERIEL NECESSAIRE

- Flacon stérile fourni et identifié par le laboratoire.

PRECONISATIONS AVANT LE PRELEVEMENT

- Effectuer le recueil avant le début d'un traitement antibiotique.
- Ne pas uriner pendant 2h avant le recueil.

NB : En cas d'écoulement urétral chez l'homme, le prélèvement peut être effectué 1h après la dernière miction.

PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT

- Ouvrir le flacon et recueillir le 1^{er} jet d'urine lors de la miction.
- Refermer rapidement et soigneusement le flacon.
- Acheminer le flacon au laboratoire dans l'heure qui suit le prélèvement.